

March 1997 Mathematics I – Answers

[Back](#)

1. ഗണം A യിൽ നിന്നും ഗണം B യിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ഏകദമാണ് f എങ്കിൽ, അതിന്റെ രംഗം എല്ലായ്പ്പോഴും B യുടെ ഉപഗണമായിരിക്കും.

ശരിയായ ഉത്തരം : **B** യുടെ ഉപഗണം

2. AP യുടെ n -ാം പദം = $3 - 5n$

(n + 1) -ാം പദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ n ന് n + 1 എന്ന വില നൽകണം.

$$(n + 1)\text{-ാം പദം} = -5n - 2$$

ശരിയായ ഉത്തരം : **-5n - 2**

3. ഒരു ദ്വിമാന സമവാക്യത്തിലെ മൂല്യഗണത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വിവേചനം ചെയ്യുന്നത് $b^2 - 4ac$ യുടെ വിലയാണ്. ഒരു ദ്വിമാന സമവാക്യത്തിൽ $b^2 - 4ac > 0$ ആണെങ്കിൽ ആ സമവാക്യത്തിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിർദ്ധാരണ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇവിടെ

$$b = q, a = p, c = r$$

$$b^2 - 4ac = q^2 - 4pr > 0$$

ശരിയായ ഉത്തരം : **$q^2 - 4pr > 0$** .

[Back](#)

4. അഞ്ച് ആധാരമായ സഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തിലെ സംഖ്യകളാണ് 0, 1, 2, 3, 4.

ഈ സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് 4 ആണ്.

അഞ്ച് ആധാരമായ സംഖ്യാനസമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക ന്യൂമറലാണ് 44

ശരിയായ ഉത്തരം : 44

5. 1 കിലോ ബൈറ്റ് = 2^{10} ബൈറ്റ്

$$2^{10} = 2^5 \times 2^5$$

$$= 32 \times 32$$

$$= 1024$$

ശരിയായ ഉത്തരം : **2^{10}** ബൈറ്റുകൾ

[Back](#)

Back

6. $\{a, b\}$ മൂല്യഗണമായിട്ടുള്ള ദ്വിമാന സമവാക്യത്തിന്റെ സാമാന്യരൂപം $x^2 - (a + b)x + ab = 0$ ആണ്. ഇവിടെ $x^2 + (a + b)x + ab$ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്.

മൂല്യഗണം = $\{-a, -b\}$.

7.
$$\frac{1}{a-b} - \frac{1}{b-a} = ?$$

$$\frac{1}{b-a} = \frac{-1}{a-b}$$

$$\frac{1}{a-b} - \frac{1}{b-a} = \frac{1}{a-b} - \frac{-1}{a-b}$$

$$= \frac{1}{a-b} + \frac{1}{a-b}$$

Back

ശരിയായ ഉത്തരം :
$$\frac{2}{a-b}$$

8. $\log (2500/7) = \log [(25 \times 100) / 7]$
 $= \log [(5^2 \times 10^2) / 7]$
 $= \log 5^2 + \log 10^2 - \log 7$
 $= 2 \log 5 + 2 \log 10 - \log 7$

$\log (2500/7) = 2 \log 5 + 2 \log 10 + k \log 7$ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്

$$k \log 7 = - \log 7$$

$$\therefore k = -1$$

ശരിയായ ഉത്തരം : $= -1$

9. $2x^3 - x^2 - 15x + 18$ ന്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ, $(x + 3)$, $(x - 2)$ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നാമത്തെ ഘടകം $(ax + b)$ എന്നിരിക്കട്ടെ.

$$(x + 3)(x - 2)(ax + b) = 2x^3 - x^2 - 15x + 18$$

രണ്ട് വശങ്ങളിലേയും x^3 ന്റെ ഗുണോത്തരങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ,

Back

[Back](#)

$$a = 2$$

സ്ഥിരസംഖ്യകൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ,

$$-6b = 18$$

$$b = 18 / -6$$

$$= -3$$

മൂന്നാമത്തെ ഘടകം = **(2x - 3)**.

$$\begin{aligned} 10. \text{പൊതുവ്യത്യാസം} &= 2\text{-ാം പദം} - 1\text{-ാം പദം} \\ &= (20 + 6\sqrt{3}) - (15 + 8\sqrt{3}) \\ &= 20 + 6\sqrt{3} - 15 - 8\sqrt{3} \\ &= 20 - 15 + 6\sqrt{3} - 8\sqrt{3} \\ &= 5 - 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. n\text{-ാം പദം} &= 3 \times 2^{n-1} \\ 1\text{-ാം പദം} &= 3 \times 2^{1-1} \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$12. x^2 - 7x = 0$$

$$x(x - 7) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, x - 7 = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, x = 7$$

$x^2 - 7x = 0$ ന്റെ മൂല്യഗണത്തിലെ പുജ്യം അല്ലാത്ത അംഗം, $x = 7$

$$13. x^2 - x - 1 = 0$$

$$\text{വിവേചകം, } b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 1 \times -1$$

$$= 1 + 4$$

$$= 5$$

ശരിയായ ഉത്തരം : **5**

[Back](#)

[Back](#)

[Back](#)

14. B യിൽ നിന്നും A യിലേയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു ഏകദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുക യുള്ളൂ. കാരണം A യിൽ ഒരംഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ശരിയായ ഉത്തരം : **1**

15. 10.5, x, 13.5 ഇവ AP യിലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്.

$$x = 10.5 + d, \quad d = \text{പൊതുവ്യത്യാസം}$$

$$13.5 - x = d$$

$$x = 13.5 - d$$

$$2x = 10.5 + 13.5$$

$$x = \frac{10.5 + 13.5}{2}$$

$$= 24/2$$

$$x = 12$$

16. $f = \{(-2,5), (-1,3), (0,1)\}$ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്

$$y = f(x) \text{ എന്ന് നമുക്കറിയാം}$$

$$\therefore f(1) = 3$$

[Back](#)

ശരിയായ ഉത്തരം : **3**

$$17. \frac{1}{x+3} - \frac{1}{2x+6} = \frac{1}{x+3} - \frac{1}{2(x+3)}$$

$$= \frac{1}{x+3} \left(1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1/2}{x+3}$$

$$= \frac{1}{2(x+3)}$$

[Back](#)

Back

18. ഉത്തരം y ആണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക

$$x^2 + 6x + 15 = (x + 3)^2 + y$$

$$(x^2 + 6x + 15) - (x + 3)^2 = y$$

$$x^2 + 6x + 15 - (x^2 + 6x + 9) = y$$

$$x^2 + 6x + 15 - x^2 - 6x - 9 = y$$

$$\therefore y = 6$$

19. 143, 144, k ഇവ അഞ്ച് ആധാരമായ സംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്നു ന്യൂനമൂല്യങ്ങളാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്.

$$143 \text{ അഞ്ച്} = 3 \times 5^0 + 4 \times 5^1 + 1 \times 5^2$$

$$= 3 \times 1 + 4 \times 5 + 1 \times 25$$

$$= 3 + 20 + 25$$

$$= 48$$

$$144 \text{ അഞ്ച്} = 4 \times 5^0 + 4 \times 5^1 + 1 \times 5^2$$

$$= 4 \times 1 + 4 \times 5 + 1 \times 25$$

$$= 4 + 20 + 25$$

$$= 49$$

Back

അടുത്ത ന്യൂനമൂല്യം 50 ആണ്

$$\begin{array}{r}
 5 \mid 50 \\
 \hline
 \mid 0 \\
 5 \mid 10 \\
 \hline
 \mid 0 \\
 2
 \end{array}$$

$$\therefore 50 = 200 \text{അഞ്ച്}$$


ശരിയായ ഉത്തരം : **200**അഞ്ച്

20. A യ്ക്ക് $A + 1$ കല്പിക്കുന്നു. A യുടെ വില $A + 1$ ആയി മാറുന്നു. അതായത് A യുടെ വില ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചു.

$$\therefore \text{വർദ്ധനവ്} = 1$$

Back

21.



തന്നിട്ടുള്ള ആരോധയഗ്രത്തിൽ, 1 എന്ന അംഗത്തിന് B യിൽ രണ്ട് പ്രതിബിംബങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധം ഒരു ഏകദമല്ല.

22. $\log 20 = 1.3010$

$$\begin{aligned} \log 2 &= \log (20/10) \\ &= \log 20 - \log 10 \\ &= 1.3010 - 1 (\log 10 = 1) \\ &= 0.3010 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log \sqrt{2} &= \log 2^{1/2} \\ &= (1/2) \log 2 \\ &= (1/2) \times 0.3010 \\ &= 0.1505 \end{aligned}$$

ശരിയായ ഉത്തരം : **0.1505**

23. ഒന്നാം പദം, $a = 64$

പൊതുഗുണകം, $r = 1/2$

$$\begin{aligned} n &= 8 \\ a_n &= ar_{n-1} \\ a_8 &= 64 \times (1/2)^{8-1} \\ &= 64 \times (1/2)^7 \end{aligned}$$

Back

$$= 2^6 / 2^7$$

$$= 1/2$$

8- 30 പദം = 1/2

24. 3 ന്റെയും X ന്റെയും ലസാഗത്യം = 3x

$$\frac{x}{3} \times \frac{x}{x} + \frac{3}{x} \times \frac{3}{3} = 2$$

$$\frac{x^2}{3x} + \frac{9}{3x} = 2$$

$$\frac{x^2 + 9}{3x} = 2$$

$$x^2 + 9 = 6x$$

Back

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

$$(x - 3)^2 = 0$$

$$x - 3 = 0$$

$$x = 3$$


മൂല്യഗണം = { 3 }

$$\begin{array}{r}
25. \quad 5 \mid 149 \\
\quad \quad \underline{4} \\
5 \mid 29 \\
\quad \quad \underline{4} \\
5 \mid 5 \\
\quad \quad \underline{0} \\
\quad \quad 1
\end{array}$$

∴ 149 = 1044 അഞ്ച്

Back

26.



$$A = \{ 1, 2, 3, 4 \}$$

പട്ടികാരീതി

$$f = \{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \}$$

എല്ലാ ക്രമജോടികളിലും, x അംഗം = y അംഗം

നിബന്ധന രീതി

$$f = \{ (x, y) / x \in A, y \in B, y = x \}$$

27. ക്യൂബിന്റെ പാദവക്കിന്റെ നീളം, $a = 28.7$ cm

$$\text{വ്യാപ്തം, } V = a^3$$

$$= (28.7)^3$$

$$\log V = \log (28.7)^3$$

$$= 3 \log 28.7$$

$$= 4.3737$$

$$\text{വ്യാപ്തം, } V = \text{antilog } (4.3737)$$

$$= 2.364 \times 10^4$$

$$= 23640 \text{ cm}^3$$

28. 1000 രണ്ട് + 25 പത്ത് = x അഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്

ഒന്നാമത്തെ രീതി

$$1000 \text{ രണ്ട്} = 0 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3$$

Back

$$= 0 + 0 + 0 + 8$$

$$= 8 \text{ പത്ത്}$$

$$\therefore 1000 \text{ രണ്ട്} + 25 \text{ പത്ത്} = 8 \text{ പത്ത്} + 25 \text{ പത്ത്}$$

$$= 33 \text{ പത്ത്}$$

$$\begin{array}{r}
 5 \mid 33 \\
 \hline
 3 \\
 5 \mid 6 \\
 \hline
 1 \\
 1
 \end{array}$$

$$\therefore 33 \text{ പത്ത്} = 133 \text{ അഞ്ച്}$$

മറ്റൊരു രീതി

$$1000 \text{ രണ്ട്} = 8 \text{ പത്ത്}$$

$$\begin{array}{r}
 5 \mid 8 \\
 \hline
 3 \\
 1
 \end{array}$$

$$= 13 \text{ അഞ്ച്}$$

Back

$$25 \text{ പത്ത്} =$$

$$\begin{array}{r}
 5 \mid 25 \\
 \hline
 0 \\
 5 \mid 5 \\
 \hline
 0 \\
 1
 \end{array}$$

$$25 \text{ പത്ത്} = 100 \text{ അഞ്ച്}$$

$$1000 \text{ രണ്ട്} + 25 \text{ പത്ത്} = 13 \text{ അഞ്ച്} + 100 \text{ അഞ്ച്}$$

$$= 113 \text{ അഞ്ച്}$$

29. $\text{മൂല്യഗണം} = \{(p + q), (p - q)\}$

$$\text{മൂല്യഗണത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ തുക} = p + q + p - q$$

$$= 2p$$

$$\text{ഗുണനഫലം} = (p + q)(p - q)$$

$$= p^2 - q^2$$

Back

Back

സമവാക്യം

$$x^2 - (തുക) x + ഗുണനഫലം = 0$$

$$x^2 - 2px + p^2 - q^2 = 0$$

30. $(a - 3), (a + 3), (a^2 - 9)$ ഇവയുടെ ലസാഗു = $a^2 - 9$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a-3} - \frac{1}{a+3} + \frac{2}{a^2-9} \\ &= \frac{a+3}{(a-3)(a+3)} - \frac{a-3}{(a-3)(a+3)} + \frac{2}{(a^2-9)} \\ &= \frac{a+3}{a^2-9} - \frac{a-3}{a^2-9} + \frac{2}{a^2-9} \\ &= \frac{(a+3) - (a-3) + 2}{a^2-9} \\ &= \frac{a+3-a+3+2}{a^2-9} \\ &= \frac{8}{a^2-9} \end{aligned}$$

Back

ശരിയായ ഉത്തരം : $\frac{8}{a^2-9}$

31. $f(x) = 2(x + 1)^2 - 5$

$x = -1,$

$$f(-1) = 2(-1 + 1)^2 - 5$$

$$= 2 \times 0^2 - 5$$

$$= 0 - 5$$

$$= -5$$

Back

[Back](#)

$$\underline{x = 2,}$$

$$f(2) = 2(2 + 1)^2 - 5$$

$$= 2 \times 3^2 - 5$$

$$= 2 \times 9 - 5$$

$$= 18 - 5$$

$$= 13$$

$$\underline{x = 0,}$$

$$f(0) = 2(0 + 1)^2 - 5$$

$$= 2 \times 1^2 - 5$$

$$= 2 \times 1 - 5$$

$$= 2 - 5$$

$$= -3$$

[Back](#)

$$\therefore \frac{f(-1) + f(0)}{f(2)} = \frac{-5 + -3}{13}$$

$$= \frac{-8}{13}$$

32. $(x - 2), (x + 2)$ ഇവ $x^3 + ax^2 - 7x + b$ യുടെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്

ഘടകസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിപരീത സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് $p(x)$ ന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് $(x - a)$ എങ്കിൽ $p(a) = 0$ ആയിരിക്കും

$\therefore (x - 2)$ ഒരു ഘടകമാണെങ്കിൽ, $p(2) = 0$ ആയിരിക്കും.

$$P(2) = 0 \Rightarrow$$

$$2^3 + a \times 2^2 - 7 \times 2 + b = 0$$

$$8 + 4a - 14 + b = 0$$

$$4a + b - 6 = 0$$

$$4a + b = 6 \dots\dots\dots (1)$$

[Back](#)

Back

$(x - 3)$ ഒരു ഘടകമാണെങ്കിൽ, $p(3) = 0$ ആയിരിക്കും

$$P(3) = 0 \Rightarrow$$

$$(-3)^3 + a(-3)^2 - 7(-3) + b = 0$$

$$-27 + 9a + 21 + b = 0$$

$$9a + b - 6 = 0$$

$$9a + b = 6 \dots\dots\dots (2)$$

$$(1) - (2),$$

$$4a + b = 6 +$$

$$-9a - b = -6$$

$$-5a = 0$$

$$a = 0 / -5$$

$$= 0$$

Back

$$(1) \Rightarrow$$

$$4 \times 0 + b = 6$$

$$b = 6$$

ശരിയായ ഉത്തരം : **a = 0, b = 6**

$$33. \quad \frac{y}{x} - \frac{x}{y} = \frac{y}{x} \times \frac{y}{y} - \frac{x}{y} \times \frac{x}{x}$$

$$= \frac{y^2}{xy} - \frac{x^2}{xy}$$

$$= \frac{y^2 - x^2}{xy}$$

$$\frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{1}{y} \times \frac{x}{x} - \frac{1}{x} \times \frac{y}{y}$$

$$= \frac{x}{xy} - \frac{y}{xy}$$

Back

Back

$$\begin{aligned} &= \frac{x - y}{xy} \\ \left[\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right] + \left[\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right] &= \frac{y^2 - x^2}{xy} + \frac{x - y}{xy} \\ &= \frac{(y^2 - x^2) + (x - y)}{xy} \\ &= \frac{(y^2 - x^2) - (y - x)}{xy} \\ &= \frac{(y - x)(y + x) - (y - x)}{xy} \\ &= \frac{(y - x)(y + x - 1)}{xy} \end{aligned}$$

Back

34. $P(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$

6 ന്റെ ഘടകങ്ങൾ = 1, 2, 3, 6

അതിനാൽ $p(1)$, $p(-1)$, $p(2)$, $p(-2)$ മുതലായവ ഒരു ഘടകം കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി പരിശോധിച്ചു നോക്കാം.

$$\begin{aligned} P(1) &= 1^3 + 4 \times 1^2 + 1 - 6 \\ &= 1 + 4 + 1 - 6 \\ &= 6 - 6 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore (x - 1)$ ഒരു ഘടകമാണ്

മറ്റ് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം = $x^3 + 4x^2 + x - 6 / (x - 1)$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 4 & 1 & -6 \\ & & 0 & 1 & 5 & 6 \\ \hline & & 1 & 5 & 6 & | & 0 \end{array}$$

ഹരണഫലം = $x^2 + 5x + 6$

Back

Back

$$= (x + 2)(x + 3)$$

ഘടകങ്ങൾ $(x - 1)$, $(x + 2)$, $(x + 3)$.

35. ഒരു A.P. യുടെ ഒന്നാം പദം a ആണെന്നും പൊതുവ്യത്യാസം d ആണെന്നും സങ്കല്പിക്കുക

$$8\text{-ാം പദം} = 120$$

$$a + (8 - 1)d = 120$$

$$a + 7d = 120 \dots\dots\dots (1)$$

$$8 \text{ പദങ്ങളുടെ തുക} = 540$$

അതായത്,

$$\left(\frac{8}{2}\right) \times (a + 120) = 540$$

$$4(a + 120) = 540$$

$$a + 120 = 135$$

$$a = 135 - 120$$

$$= 15$$

$$15 + 7d = 120$$

$$7d = 105$$

$$d = 15$$

$$\text{ഒന്നാം പദം} = 15$$

$$\text{പൊതുവ്യത്യാസം} = 15$$

Back

36. ചതുരത്തിന്റെ നീളം x എന്നും വീതി y എന്നും കരുതുക.

$$x = 2y - 3 \text{ എന്നും } xy = 104 \text{ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്.}$$

$$xy = 104$$

$$(2y - 3)y = 104$$

$$2y^2 - 3y - 104 = 0$$

$$a = 2, \\ b = -3, \\ c = -104.$$

Back

[Back](#)

വിഭവചകം, $b^2 - 4ac$

$$= (-3)^2 - 4 \times 2 \times -104$$

$$= 9 + 832$$

$$= 841$$

വീതി, $y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$= \frac{-(-3) \pm \sqrt{841}}{2 \times 2}$$

$$= \frac{3 \pm 29}{4}$$

$$= 32/4, -26/4$$

$$= 8, -6.5$$

[Back](#)

വീതി = 8 cm

നീളം = $2 \times 8 - 3$

$$= 16 - 3$$

$$= 13$$

നീളം = 13 cm

വീതി = 8 cm

37. GP യുടെ ഒന്നാം പദം, $a_1 = 1/49$

അവസാനപദം, $a_n = 343$

പൊതുഗുണകം = 7

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$343 = (1/49)r^{n-1}$$

$$7^{n-1} = 343 \times 49$$

[Back](#)

Back

$$= 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$$

$$= 7^5$$

$$n - 1 = 5$$

$$n = 5 + 1$$

$$= 6$$

വശങ്ങളുടെ എണ്ണം = 6

$$\text{തുക} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$= \frac{1}{49} \times \frac{7^6 - 1}{7 - 1}$$

$$= \frac{7^6 - 1}{49 \times 6}$$

Back

38. ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം

$$A = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}$$

$$s = \frac{a + b + c}{2}$$

a, b, c ഇവ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ്.

$$s = \frac{10.5 + 14.5 + 15}{2}$$

$$= 40/2$$

$$= 20$$

$$s - a = 20 - 10.5$$

$$= 9.5$$

$$s - b = 20 - 14.5$$

Back

$$= 5.5$$

[Back](#)

$$s - c = 20 - 15$$

$$= 5$$

വിസ്തീർണ്ണം, $A = \sqrt{20 \times 9.5 \times 5.5 \times 5}$

$$\log A = \log \sqrt{20 \times 9.5 \times 5.5 \times 5}$$

$$= (1/2) \log (20 \times 9.5 \times 5.5 \times 5)$$

$$= (1/2) [\log 20 + \log 9.5 + \log 5.5 + \log 5]$$

$$= (1/2) [1.3010 + 0.9777 + 0.7404 + 0.6990]$$

$$= (1/2) \times 3.7181$$

$$= 1.85905$$

$$\approx 1.8591$$

[Back](#)

വിസ്തീർണ്ണം, $A = \text{antilog} (1.8591)$

$$= 7.230 \times 10^1$$

$$= 72.30 \text{ cm}^2$$

39. അൽഗോരിതം

സ്റ്റേപ്പ് 1 : $N = 0$ എന്ന വില സ്വീകരിക്കുക

സ്റ്റേപ്പ് 2 : $N = N + 1$ എന്ന വില സ്വീകരിക്കുക

സ്റ്റേപ്പ് 3 : N പ്രിന്റ് ചെയ്യുക


സ്റ്റേപ്പ് 4 : $N = 30$ ആണോ?

ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേപ്പ് 5 ലേക്ക് പോകുക

അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേപ്പ് 2 ലേക്ക് പോകുക

സ്റ്റേപ്പ് 5 : നിർത്തുക

[Back](#)



40. $x^2 + x - 2 = 0$ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്

$$x^2 = -x + 2$$

$y = x^2$ ന്റേയും $y = -x + 2$ ന്റേയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. $y = x^2$ ന്റെ ഗ്രാഫ് ഒരു പരാബോളയും $y = -x + 2$ ന്റെ ഗ്രാഫ് ഒരു നേർരേഖയും ആയിരിക്കും. ഇവയുടെ സംഗമബിന്ദുക്കളുടെ x നിർദ്ദേശാങ്കമായിരിക്കും സമവാക്യത്തിന്റെ നിർദ്ധാരണമൂല്യം

$$y = x^2$$


x	y
-4	16
-3	9
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4
3	9
4	16

$$y = -x + 2$$

Back

x	y
-4	6
-3	5
-2	4
-1	3
0	2
1	1
2	0
3	-1
4	-2

ഗ്രാഫ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്



Back

രണ്ട് ഗ്രാഫുകളും സംഗമിക്കുന്നത് $(-2, 4)$ $(1, 1)$ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിലാണ്.

ഇവയുടെ x നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ $x = -2$, $x = 1$ എന്നിവയാണ്.

മൂല്യഗണം = $\{-2, 1\}$.

Back

up